

S. Reed Shimamoto, MD • Neal Jain, MD

Los Antihistamínicos que Ser Detenido para Pruebas de Alergia

Instrucciones: Detenga los siguientes 5 días antes de la prueba

Actagen	Deconamine	Promethazine
Actifed	Dimenhydrinate	Rondec
Acrivastine	Dimetane	Rynatan
Allegra (any)	Dimetapp	Ryna-12
Allerclear	Dipenydramine	Rynatuss
Allerfrin	Doxepin	Semprex-D
Alertec/Aller-Tec	Dramamine	Tanafed
Aller-Fex	Drixoral	Tavist
Antivert	Duravent-DA	Triaminic
Atarax	Fexofenadine	Triaminicol
Benadryl	Histavent-LA	Trinalin
Bromphed	Histex	Triprolidine
Brompheniramine	Hydroxyzine	Tussi-12
Cetirizine	Meclizine	Tussionex
Chlorpheniramine	Ominihist-LA	Vistaril
Chlor-trimeton	Ornade	Wal-Fex
Clarinox (any)	Pedicare	Wal-Tin
Claritin (any)	Periactin	Wal-Zyr
Clemastine	Phenergan	Xyzal
Cyproheptadine	Poly-histine	Zyrtec

Aerosoles Nasaes

Astelin
Astepro
Azelastine
Patanase

Gotas para los Ojos

Pataday
Patanol
Olopatadine
Optivar
Zaditor

También detener cualquier medicamento que tiene las palabras "Sinus", "Alergia" o "HIST"

Por favor, tenga en cuenta que muchos medicamentos de venta libre tienen los antihistamínicos en ellos (es decir, de los senos, dolor de cabeza, sueño o la tos medicamentos). Tendrá que ser dejado de 5 días antes de la prueba, así Estos medicamentos. Si no está seguro de si el medicamento que usted está tomando contiene un antihistamínico, por favor llame a nuestra oficina para recibir asesoramiento.

NO deje de tomar otros medicamentos, especialmente para el corazón, el hígado, los pulmones u otras condiciones. Si por alguna razón usted no puede dejar la medicación de la alergia no se preocupe. Nos vemos por la consulta y luego podemos volver a programar para la prueba otra vez.