

S. Reed Shimamoto, MD • Neal Jain, MD

## Los Antihistamínicos que Ser Detenido para Pruebas de Alergia

Instrucciones: Detenga los siguientes 5 días antes de la prueba

|                   |                |              |
|-------------------|----------------|--------------|
| Actagen           | Deconamine     | Promethazine |
| Actifed           | Dimenhydrinate | Rondec       |
| Acrivastine       | Dimetane       | Rynatan      |
| Allegra (any)     | Dimetapp       | Ryna-12      |
| Allerclear        | Dipenydramine  | Rynatuss     |
| Allerfrin         | Doxepin        | Semprex-D    |
| Alertec/Aller-Tec | Dramamine      | Tanafed      |
| Aller-Fex         | Drixoral       | Tavist       |
| Antivert          | Duravent-DA    | Triaminic    |
| Atarax            | Fexofenadine   | Triaminicol  |
| Benadryl          | Histavent-LA   | Trinalin     |
| Bromphed          | Histex         | Tripolidine  |
| Brompheniramine   | Hydroxyzine    | Tussi-12     |
| Cetirizine        | Meclizine      | Tussionex    |
| Chlorpheniramine  | Ominihist-LA   | Vistaril     |
| Chlor-trimeton    | Ornade         | Wal-Fex      |
| Clarinex (any)    | Pedicare       | Wal-Tin      |
| Claritin (any)    | Periactin      | Wal-Zyr      |
| Clemastine        | Phenergan      | Xyzal        |
| Cyproheptadine    | Poly-histine   | Zyrtec       |

### Aerosoles Nasaes

Astelin  
Astepro  
Azelastine  
Patanase

### Gotas para los Ojos

Pataday  
Patanol  
Olopatadine  
Optivar  
Zaditor

### Otros medicación

Benzodiazepines  
Lunesta  
Trazodone  
Xanax  
Póngase en contacto con algun prescripción a médico antes de descontinuar los medicamentos que aparecen en 'Otros'

**También detener cualquier medicamento que tiene las palabras "Sinus", "Alergia" o "HIST"**

Por favor, tenga en cuenta que muchos medicamentos de venta libre tienen los antihistamínicos en ellos (es decir, de los senos, dolor de cabeza, sueño o la tos medicamentos). Tendrá que ser dejado de 5 días antes de la prueba, así Estos medicamentos. Si no está seguro de si el medicamento que usted está tomando contiene un antihistamínico, por favor llame a nuestra oficina para recibir asesoramiento.

NO deje de tomar otros medicamentos, especialmente para el corazón, el hígado, los pulmones u otras condiciones. Si por alguna razón usted no puede dejar la medicación de la alergia no se preocupe. Nos vemos por la consulta y luego podemos volver a programar para la prueba otra vez.